

4 de abril, 2012

Contactos para los medios de

Brandy Gillery 414-286-3790 (horas de oficina)
Anna Benton 414-397-1620 (después de horas de trabajo)

Para comunicación inmediata comunicación:

Funcionarios de la Ciudad de Milwaukee están investigando un brote de Salmonella

El Departamento de Salud de la Ciudad de Milwaukee está colaborando con agencias de salud pública estatales y nacionales en la investigación de un brote en varios estados de infecciones de Salmonella del serotipo Bareilly.

Para el 4 de abril de 2012, 8 casos de infección por Salmonella Bareilly han sido reportados entre residentes de Wisconsin desde febrero. Los ocho casos corresponden a personas adultas, tres de las cuales viven en el Condado de Milwaukee. Los 8 casos se han recuperado de la infección, sin embargo tres de los residentes de Milwaukee requirieron hospitalización.

Los funcionarios del Departamento de Salud de la Ciudad de Milwaukee están apoyando la investigación a nivel nacional entrevistando a los pacientes acerca de sus costumbres alimenticias y cualquier tipo de exposición a comidas, recogiendo información para ayudar al esfuerzo nacional de identificar la causa o causas de este brote.

La investigación está progresando, y nueva información se dará al público en cuanto esté disponible. Los Centros para Control y Prevención de Enfermedades (CDC en inglés) han creado una página web para este brote a la que se puede entrar en: <http://www.cdc.gov/sallmonela/bareilly-04-12/index.html>.

En este momento no se les ha advertido a los consumidores que eviten ningún tipo específico de alimentos o restaurantes. Si un tipo de alimento fuera identificado como causante de este brote, los funcionarios de salud pública alertarían al público y se tomarían las medidas del caso para prevenir contagios adicionales.

La mayoría de las personas infectadas con Salmonella sufren de diarrea, fiebre y dolores abdominales entre 12 y 72 horas después de la infección. La enfermedad es usualmente diagnosticada por cultivos de muestras de heces. La enfermedad dura entre 4 y 7 días, pero pueden darse casos graves. Niños, ancianos y personas con problemas en el sistema inmunológico pueden desarrollar cuadros más severos de la infección.

Aunque la mayoría de las personas se recuperan sin necesidad de tratamiento médico, aquellas personas que piensen que podrían estar enfermas por haber consumido comida potencialmente contaminada, deberían consultar con sus proveedores de cuidados médicos, para evitar una infección severa y ayudar en la investigación de este brote.

Como siempre, se recomienda enfáticamente, un cuidadoso lavado de manos después de usar el servicio sanitario y antes y después de cocinar.