

# PLAN DE ACCIÓN DEL ENVENENAMIENTO DE PLOMO

SI LA SANGRE VENOSA EXTRAÍDA DE UN BRAZO INDICA UN NIVEL DE PLOMO ARRIBA DE:

**3.5**

**Haga una prueba de plomo cada 6 meses**

La mayoría de los niños están por debajo de este nivel

**10**



**Haga una prueba de plomo cada 3 meses**

En el nivel 15, la ciudad asigna una enfermera administradora de casos y revisa el hogar para detectar PELIGROS DE PLOMO

**20**

**Haga una prueba de plomo CADA MES**

Tenemos que asegurarnos de que los niveles se estén bajando


**45**





**¡VAYA A URGENCIAS!**

Siga las instrucciones del proveedor médico.  
¡NO REGRESE A CASA HASTA QUE LE AVISEN QUE ESTÁ SEGURO!

**TODOS LOS NIÑOS MENORES DE 6 AÑOS DEBEN SER EXAMINADOS PARA DETECTAR EL ENVENENAMIENTO POR PLOMO**



HAY QUE HACERLES UNA PRUEBA DE PUNCIÓN DIGITAL A ESTAS EDADES:



## MEDIDAS PREVENTATIVAS

- Sacuda su casa con un trapo mojado y trapee su casa dos veces a la semana
- Lave las manos de su hijo con jabón frecuentemente, y siempre antes de comer
- Dele a su hijo alimentos ricos en hierro, vitamina C y calcio
- Cubra o bloquee los peligros del plomo como la pintura descascarada y mantenga a los niños alejados
- Abra su llave de agua fría por 3 minutos antes de usarla, o beba agua filtrada

